



Amastera 
Big Cluster

Viazera
Seeds of Growth



Amastera

Grower/growing characteristics (Plant related)

FRUITS / CLUSTER:

5

HARVEST TYPE:

Cluster

VIGOR PLANT:

Strong

RESISTANCES HR:

Va, Vd, Fol (0-2), Ff(A-E) ToMV, For

RESISTANCES IR:

On

Supply chain processing characteristics

SHELF LIFE:

Good

FIRMNESS AFTER TEN DAYS:

Good

GREEN PARTS AFTER TEN DAYS:

Good

USAGE ADVISE:

Fresh carton or pre-packed

Shopper characteristics (Fruit related)

FRUIT SHAPE:

High Round

AVERAGE FRUIT WEIGHT IN GRAMS:

150-170

COLOR:

Red

JOINTED / JOINTLESS:

Jointed

SHININESS:

Good

REMARKS:

High yield potential

SUGGESTED SHOPPER USAGE:

Fresh cut and cooking

Zaai en opkweek tot planten

- ✓ Gezien de sterke groeikracht, wordt geadviseerd om Maxifort of een meer generatieve onderstam te nemen.
- ✓ Bij een te vegetatieve groei tijdens opkweek, kan er een blaadje worden weggehaald.

Start teelt

- ✓ Het advies is om niet gelijk op het gat te planten, maar om de plant eerst te beheersen, totdat de 1e tros in bloei staat.
- ✓ Advies startafstand is 2,5 pl/m². In de periode Februari/Maart kunnen er extra stengels worden bijgehouden.
- ✓ Voor de extra dief, dient men een sterk gewas te creëren, waardoor de extra dief zich beter kan ontwikkelen.
- ✓ De eindafstand op ± 3,3 pl/m² houden, in warmere omstandigheden kan dit tot ± 3,5 - 3,6 pl/m².

Gedurende teelt

- ✓ De waterconsumptie van de Amastera is iets hoger dan de huidige standaard.
- ✓ De volgende instellingen worden geadviseerd als basis instelling:

Voornacht

± 14 - 15 °C, gedurende ± 2 - 3 uur

Nacht

Verhogen naar ± 16,5 - 17,5 °C (een te snelle verhoging in temperatuur kan leiden tot een vegetatieve actie en tot een kortere trosorganisatie en meer plantlengte). Gezien de planteigenschappen van de Amastera is het advies om voor een rustigere verhoging te gaan.

Dag

Maximum ± 26 °C (afhankelijk van de lichtverhoging)

De ideale temperatuur is afhankelijk van de instraling, een verhoging van de temperatuur wordt geadviseerd bij dagen met meer instraling. Door een dag-nacht verschil te creëren, bevordert dit de generativiteit van de Amastera.

Einde teelt

Aan het einde van de teelt goed opletten op blad/vrucht verhouding, zorg ervoor dat de Amastera niet teveel in het blad staat.

Voor meer informatie:

Geert van der Wel

☎ +31 6 34 59 45 16

✉ geert.van.der.wel@hazera.com

Marcel van Kester

☎ +31 6 43 84 07 34

✉ marcelvan.kester@hazera.com

🌐 www.hazera.com

✉ info@hazera.com

📘 Hazera on Facebook

Hazera
Seeds of Growth